

Tại sao trẻ sơ sinh cần được sàng lọc khiếm thính?

Việc phát hiện trẻ bị khiếm thính muộn sẽ làm việc điều trị và giúp trẻ phát triển ngôn ngữ rất khó khăn. Sàng lọc khiếm thính cho trẻ sơ sinh giúp phát hiện từ rất sớm những trẻ có vấn đề về thính giác để kịp thời can thiệp, điều này có ý nghĩa rất quan trọng với sự phát triển ngôn ngữ và khả năng nói của trẻ trong những năm đầu đời của trẻ. Trẻ bị khiếm thính nếu được phát hiện và can thiệp sớm sẽ có thể nghe, nói và phát triển như trẻ bình thường.

Thế nào là sàng lọc khiếm thính và nên kiểm tra thính giác cho trẻ sơ sinh khi nào?

Sàng lọc khiếm thính là kiểm tra thính giác để xem trẻ có bị khiếm thính không. Việc kiểm tra được thực hiện sau khi sinh ít nhất 24 giờ trong thời gian con bạn đang nằm tại bệnh viện và trước khi xuất viện về nhà.

Sàng lọc khiếm thính cho trẻ sơ sinh được thực hiện như thế nào?

Có một loại máy đặc biệt giúp phát hiện sự phản ứng của trẻ sơ sinh đối với âm thanh. Việc kiểm tra rất đơn giản và không đau. Thời gian kiểm tra thường kéo dài khoảng từ 10 - 20 phút nếu trẻ ngủ hoặc nằm yên. Bạn sẽ nhận được kết quả ngay sau khi đánh giá.



Một trẻ sơ sinh đang được kiểm tra thính lực

Kết quả sàng lọc khiếm thính có ý nghĩa như thế nào ?

- Nếu kết quả ghi là **“ĐẠT”** nghĩa là thính giác của trẻ bình thường vào lúc đánh giá tuy nhiên bạn cần nhớ là một vài trẻ có thể bị khiếm thính sau đó một thời gian.

- Nếu kết quả ghi là **“NGHI NGỜ”** nghĩa là thính giác của trẻ không đạt yêu cầu trong lần đầu tiên, bạn sẽ được hướng dẫn để đưa con bạn đi sàng lọc lại lần thứ hai sau nửa ngày (12 tiếng) hoặc một vài giờ tùy theo loại máy sử dụng.

- Nếu lần thứ hai kết quả vẫn là **“NGHI NGỜ”**, bạn sẽ được hướng dẫn để đưa trẻ đi khám và đánh giá thính lực tại cơ sở chuyên khoa về thính lực trẻ em để chẩn đoán xác định và tư vấn.

Nhiều trẻ có kết quả **“NGHI NGỜ”** trong lần sàng lọc đầu tiên nhưng sẽ **“ĐẠT”** trong những lần kiểm tra sau này.

Lý do nào làm trẻ có kết quả “NGHI NGỜ” khi sàng lọc khiếm thính?

Kết quả **“NGHI NGỜ”** có thể không phải do trẻ bị khiếm thính thật sự mà có thể do có nước ối đọng ở trong tai, do trẻ khóc hoặc trẻ cử động trong quá trình kiểm tra. Vì vậy cần phải kiểm tra lại thính lực của trẻ để có kết quả chính xác.

Bạn phải làm gì nếu trong lần sàng lọc khiếm thính thứ hai con bạn vẫn có kết quả “NGHI NGỜ”?

Điều quan trọng nhất mà bạn nên làm là đưa trẻ trở lại để tiến hành kiểm tra thính giác trong vòng hai tuần hoặc theo hướng dẫn của nhân viên y tế để đưa trẻ đến khám ở các cơ sở chuyên khoa sâu về thính giác trẻ em.

Những nguyên nhân nào có thể làm cho trẻ bị điếc ?

Trẻ có thể bị điếc do một hoặc một số nguyên nhân sau:

- Mẹ bị nhiễm một số siêu vi khuẩn trong thời kỳ mang thai (như bị Rubella)
- Trong gia đình đã có người bị điếc
- Trẻ sinh thiếu tháng hoặc rất nhẹ cân khi sinh
- Trẻ bị bệnh nặng ngay sau sinh
- Trẻ bị dị dạng ở đầu, tai, mặt
- Trẻ bị viêm màng não hoặc viêm não
- Trẻ bị vàng da nặng phải truyền máu v.v...

Trẻ phát triển ngôn ngữ như thế nào?

Một trẻ có thính giác bình thường sẽ phát triển ngôn ngữ như sau:

Từ lúc sinh đến 3 tháng tuổi

- Giật mình hoặc khóc khi nghe tiếng động lớn
- Có vẻ đang lắng nghe tiếng nói
- Phát ra âm thanh như “ô..ô”

Từ 3 đến 6 tháng tuổi

- Thức dậy khi nghe tiếng động thành linh
- Nhận ra tiếng nói quen thuộc
- Thích lục lọi hoặc các đồ chơi khác phát ra tiếng
- Dõi mắt theo âm thanh
- Bắt đầu bi bô

Từ 6 đến 9 tháng tuổi

- Quay đầu về phía có âm thanh
- Bắt đầu bắt chước các âm thanh tiếng nói, trẻ bập bẹ các âm thanh khác nhau như “ba-ba”, v.v...
- Có đáp ứng khi nghe gọi tên

Từ 9 đến 12 tháng tuổi

- Lặp lại những từ ngữ và âm thanh đơn giản
- Phản ứng lại trước tiếng hát hoặc tiếng nhạc
- Gọi đúng từ “mẹ” hoặc “ba”

Những biểu hiện nào ở trẻ làm bạn nghi ngờ trẻ bị khiếm thính?

Tùy theo độ tuổi của trẻ mà sẽ có những dấu hiệu nghi ngờ trẻ bị khiếm thính như sau:

- Không thấy trẻ có sự tiến triển trong phát âm hoặc trẻ chậm nói
- Trẻ kêu đau tai (có thể do viêm tai giữa).
- Trẻ không nhận biết hoặc khó nhận biết âm thanh từ đâu vọng đến
- Trẻ nói quá nhỏ hoặc quá lớn tiếng
- Trẻ mở tivi hoặc vặn máy nghe nhạc quá lớn
- Trẻ thể hiện những khó khăn trong giao tiếp hoặc trong học tập

Các dấu hiệu này không nhất thiết là trẻ bị khiếm thính nhưng nếu thấy trẻ có một hoặc một số dấu hiệu như trên cần cho trẻ đi khám bác sĩ tai mũi họng ngay.

Khi phát hiện sớm trẻ bị khiếm thính sớm, bạn cần hợp tác với các bác sĩ tai mũi họng, các chuyên gia về thính lực trẻ em để có thể phối hợp với nhau giúp trẻ phát triển.

Để biết thêm thông tin, mời các bạn vào trang web:
<http://www.ditatbamsinh.vn>



KIỂM TRA THÍNH GIÁC CHO TRẺ SƠ SINH



Trẻ khiếm thính nếu không được phát hiện sớm sẽ không phát triển được ngôn ngữ, bị câm, không phát triển được kỹ năng giao tiếp, chậm phát triển tâm thần và gặp nhiều khó khăn trong việc học..

Nhìn bề ngoài của trẻ sơ sinh sẽ không thể nào biết được trẻ có bị khiếm thính hay không do đó cần kiểm tra thính lực cho trẻ sơ sinh để có thể sớm phát hiện tình trạng khiếm thính của trẻ.